

# 数学新星问题征解

第二十五期 (2018.01)

主持: 牟晓生

第一题. 给定实数  $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ , 满足  $x_i^2 + y_i^2 = 1, \forall i$ . 求下列表达式

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j (x_i y_j - x_j y_i)^2$$

在  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$  时的最大值.

(哈佛大学 牟晓生 供题)

第二题. 在平行四边形  $ABCD$  中,  $E$  在直线  $DC$  上, 且  $AE \perp BC$ ;  $F$  在直线  $BC$  上, 且  $AF \perp DC$ . 以  $BD$  上任意点  $I$  为圆心,  $IA$  为半径作圆, 与  $AE, AF$  分别交于  $G, H$ . 过  $G, H$  的圆  $I$  的切线交于  $J$ . 证明:  $J$  在直线  $EF$  上.

(西安交大附中 金磊 供题)

第三题. 设  $S$  是正实数集, 满足以下两个条件:

(1)  $1 \in S$ , 且  $S$  在加法与乘法下封闭;

(2) 存在  $S$  的子集  $P$ , 使得  $S$  中任意不等于 1 的数都能唯一表示成  $P$  中若干数 (允许相同) 的乘积.

问:  $S$  是否一定是正整数集?

(普林斯顿大学 郑凡 供题)

第四题. 设  $S_1, \dots, S_p, T_1, \dots, T_p$  是  $\{1, \dots, N\}$  的互异子集, 满足任意  $S_i$  与任意  $T_j$  的交集非空. 证明:  $p < (3 - \sqrt{5}) \cdot 2^{N-1}$ .

(IMO 2007 预选题 反向结论)