

好题与妙解（三）

——2016 年新星五一班中的若干问题

冷岗松

本文将选择笔者为 2016 年数学新星五一班所编的讲义“数学问题精选 30 例”中的若干问题进行评析.

题 1 (圣彼得堡, 2001) 设 x_1, x_2, \dots, x_{10} 是 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的实数, 满足

$$\sin^2 x_1 + \sin^2 x_2 + \dots + \sin^2 x_{10} = 1.$$

证明: $3(\sin x_1 + \sin x_2 + \dots + \sin x_{10}) \leq \cos x_1 + \cos x_2 + \dots + \cos x_{10}$.

分析 本题不容易入手. 思考的关键点应是怎样才能产生常数 3 (相关连的是常数 9). 这诱发我们用 Cauchy 不等式, 导出局部不等式来达到目的.

证明 对任意的正整数 $i (1 \leq i \leq 10)$, 应用 Cauchy 不等式可得

$$\cos x_i = \sqrt{1 - \sin^2 x_i} = \sqrt{\sum_{j \neq i} \sin^2 x_j} \geq \frac{1}{3} \sum_{j \neq i} \sin x_j.$$

因此

$$\sum_{i=1}^{10} \cos x_i \geq \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{10} \sum_{j \neq i} \sin x_j = 3 \left(\sum_{i=1}^{10} \sin x_i \right).$$

□

题 2 (白俄罗斯, 2003) 设 Q_1 是不小于 1 的有理数的集合, 函数 $f: Q_1 \rightarrow \mathbf{R}$ 满足对任意 $x, y \in Q_1$, 均有

$$|f(x+y) - f(x) - f(y)| < a,$$

其中 a 为某个正实数. 证明: 存在实数 q 使得对所有 $x \in Q_1$, 均有

$$\left| \frac{f(x)}{x} - q \right| < 2a.$$

收稿日期: 2016-05-22.

分析 先考虑 x 取正整数 n 的情况, 这时猜测 q 取第一个初始函数值 $f(1)$ 是自然的. 于是需要估计 $|f(n) - nf(1)|$, 这时应想到用差分方法, 把它用差分 $f((k+1)x) - f(kx)$ 来表示, 再联想到条件便可得到非常有用的差分估计式: $|f((k+1)x) - f(kx) - f(x)| < a$.

解 先证下面关键的引理.

引理 对任意正整数 n 及所有的 $x \in Q_1$ 有

$$|f(nx) - nf(x)| < (n-1)a. \quad (1)$$

事实上, 由条件可得

$$|f((k+1)x) - f(kx) - f(x)| < a,$$

因此

$$\begin{aligned} |f(nx) - nf(x)| &= \left| \sum_{k=1}^{n-1} (f((k+1)x) - f(kx) - f(x)) \right| \\ &< \sum_{k=1}^{n-1} a = (n-1)a. \end{aligned}$$

回到原题. 在 (1) 中令 $x = 1$, 可得

$$nf(1) - (n-1)a \leq f(n) \leq nf(1) + (n-1)a. \quad (2)$$

再在 (1) 中令 $x = \frac{m}{n} \geq 1$, 可得

$$nf\left(\frac{m}{n}\right) - (n-1)a \leq f(m) \leq nf\left(\frac{m}{n}\right) + (n-1)a. \quad (3)$$

结合 (2) 和 (3) 可得

$$mf(1) - (m+n-2)a \leq nf\left(\frac{m}{n}\right) \leq mf(1) + (m+n-2)a. \quad (4)$$

将 (4) 两边同除以 m , 并令 $x = \frac{m}{n}$, $q = f(1)$, 则有

$$\left| \frac{f(x)}{x} - q \right| \leq \left(1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{m} \right) a < \left(1 + \frac{1}{x} \right) a \leq 2a.$$

□

题 3 设 x_1, x_2, \dots, x_n 是实数, 记 $m_{ij} = x_j - x_i$, $1 \leq i < j \leq n$. 证明:

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} m_{ij}(1 - m_{ij}) \leq \frac{n^2 - 1}{12}.$$

这个问题是笔者提供给 2012 年国家集训队选拔考试的预选题.

分析 注意到不等式的左边以差的形式出现, 因此它是关于平移变换不变

的, 即将所有的 x_i 用 $x_i + t$ (t 是某个实数) 来替代, 不等式不变. 故我们可设 $\sum_{i=1}^n x_i = 0$. 这称作为“归零”. 本题的一个关键技巧是主动用归零等式消去表达式中的二次混合项.

证明 注意到不等式是在变元的平移变换下不变的, 因此不妨设

$$\sum_{i=1}^n x_i = 0, \quad (1)$$

否则可将所有的 x_i 用 $x_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 来替代. 这样, 由 (1) 可得

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i < j \leq n} m_{ij}(1 - m_{ij}) &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} m_{ij}(1 - m_{ij}) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (2i - n - 1)x_i - n \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \left(-n \left(x_i - \frac{2i - n - 1}{2n} \right)^2 + \frac{(2i - n - 1)^2}{4n} \right) \\ &\leq \sum_{i=1}^n \frac{(2i - n - 1)^2}{4n} = \frac{n^2 - 1}{12}. \end{aligned}$$

□

题 4 (Murray Klamkin, Crux Math.) 设 x_1, x_2, \dots, x_n ($n \geq 3$) 是非负实数, 满足 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$. 求

$$F = x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + \dots + x_n^2 x_1$$

的最大值.

分析 首先我们来猜测可能的最大值点. 当 $n = 3$ 时, 可能的最大值点应当是三个: $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, $(1, 0, 0)$, $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0)$. 通过尝试易发现在第三个处的值大, 应该是最大值点. 这样对一般的 n , 我们自然猜测 F 的最大值点是 $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0, \dots, 0)$ 或它的任意一个轮换, 对应的最大值是 $\frac{4}{27}$.

现在尝试用归纳法证明. 有两点值得注意: 其一, 这里的表达式是轮换对称的, 因此不能将所有变元排序, 但可用优化假设, 即设定最大变元; 其二, 因为可能取最大值的点在边界上, 肯定要有“调整”的想法.

本题的真正难点是 $n = 3$ 的证明, 既要又调整的想法, 又要思考怎样“弃项”将问题简化.

解 我们仅须证明 $F \leq \frac{4}{27}$.

先考虑 $n = 3$ 的情况. 为简单起见, 将这种情况用引理表述.

引理 设 a, b, c 是非负实数, 使得 $a + b + c = 1$, 则

$$a^2b + b^2c + c^2a \leq \frac{4}{27}.$$

事实上, 不妨设 $a = \max(a, b, c)$, 注意到 $(a + \frac{c}{2}) + (b + \frac{c}{2}) = 1$, 我们希望证明下面的不等式

$$a^2b + b^2c + c^2a \leq \left(a + \frac{c}{2}\right)^2 \left(b + \frac{c}{2}\right). \quad (1)$$

事实上, (1) 可由两个明显的不等式 $abc \geq b^2c$ 及 $\frac{a^2c}{2} \geq \frac{c^2a}{2}$ 立即推出.

又由算术—几何平均值不等式有

$$\left(\frac{a + \frac{c}{2}}{2}\right)^2 \left(b + \frac{c}{2}\right) \leq \frac{1}{27} \left(\frac{a + \frac{c}{2}}{2} + \frac{a + \frac{c}{2}}{2} + b + \frac{c}{2}\right)^3 = \frac{1}{27}. \quad (2)$$

结合(1) 和(2) 立得引理中要证的不等式.

回到原题.

对 n 用归纳法. 由引理知 $n = 3$ 结论成立. 假设结论对 $n - 1$ 成立, 现考虑 n 的情况. 不妨设 $x_3 = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 则

$$x_1^2x_2 + x_2^2x_3 + \dots + x_n^2x_1 \leq (x_1 + x_2)^2x_3 + x_3^2x_4 + \dots + x_n^2(x_1 + x_2). \quad (3)$$

再对 $x_1 + x_2, x_3, \dots, x_n$ 用归纳假设有

$$(x_1 + x_2)^2x_3 + x_3^2x_4 + \dots + x_n^2(x_1 + x_2) \leq \frac{4}{27}. \quad (4)$$

结合(3) 和(4) 立得结论对 n 成立.

另一方面, 取 $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0, \dots, 0)$, 得 $F = \frac{4}{27}$. 故 F 的最大值为 $\frac{4}{27}$. \square

题 5 (台湾 TST, 2005) 求所有正整数 $n \geq 3$ 使得对于任意 n 个正数 a_1, a_2, \dots, a_n , 存在一个正整数 M_n , 满足不等式

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}} \leq M_n \left(\frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2} + \dots + \frac{a_n}{a_{n-1}} + \frac{a_1}{a_n} \right).$$

分析 取一个好的试验序列是解决本题的关键. 等比序列 $\{k, k^2, \dots, k^n\}$ 是一个最佳的选择, 这是因为当 n 较大时, 左边是变化是“快速”的(即非线性的), 而右边几乎是线性的, 这样满足要求的正整数 M_n 不可能存在.

解 先证明当 $n \geq 4$ 时, 满足要求的正整数 M_n 不存在. 若不然, 在题中的不等式中, 取 $a_1 = k, a_2 = k^2, \dots, a_n = k^n$ 可得

$$\frac{k + k^2 + \dots + k^n}{\sqrt[n]{k k^2 \dots k^n}} \leq M_n \left((n-1)k + \frac{1}{k^{n-2}} \right). \quad (1)$$

而注意到

$$\frac{k + k^2 + \cdots + k^n}{\sqrt[n]{k^2 \cdots k^n}} > \frac{k^n}{k^{\frac{n+1}{2}}} = k^{\frac{n-1}{2}},$$

这样由 (1) 可得

$$k^{\frac{n-3}{2}} \leq M_n \left((n-1) + \frac{1}{k^{n-1}} \right). \quad (2)$$

注意到 $n \geq 4$, 在 (2) 中令 $k \rightarrow +\infty$, 便知左边趋于无穷大, 而右边趋于 $M_n(n-1)$, 矛盾!

再证明当 $n = 3$ 时, 满足要求的正整数 M_3 存在, 如 $M_3 = 3$ 就满足要求.

对任意的正实数 a_1, a_2, a_3 , 记

$$M = \frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2} + \frac{a_1}{a_3},$$

则由 $\frac{a_2}{a_1}, \frac{a_3}{a_2}, \frac{a_1}{a_3}$ 均小于 M , 可得

$$a_2 > \frac{1}{M}a_3, \quad a_1 > \frac{1}{M}a_2 > \frac{1}{M^2}a_3. \quad (3)$$

不妨设 $a_3 = \max(a_1, a_2, a_3)$, 则由 (3) 可得

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3}{\sqrt[3]{a_1 a_2 a_3}} < \frac{3a_3}{\sqrt[3]{\frac{1}{M^2}a_3 \cdot \frac{1}{M}a_3 \cdot a_3}} = 3M,$$

这就是所要证明的.

综上, 所求的 $n = 3$. □

题 6 求最小的实数 λ , 使得对任意的三个复数 $z_1, z_2, z_3 \in \{z \in \mathbb{C} | |z| < 1\}$, 若 $z_1 + z_2 + z_3 = 0$, 则

$$|z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1|^2 + |z_1 z_2 z_3|^2 < \lambda.$$

这个问题是 2016 年国家集训队的测试试题, 系笔者提供.

解 1 不妨设 $|z_1| = \max\{|z_1|, |z_2|, |z_3|\} > 0$. 记 $u = \frac{z_2}{z_1}, v = \frac{z_3}{z_1}$, 则

$$|u| \leq 1, \quad |v| \leq 1, \quad u + v = -1. \quad (1)$$

由 (1) 知 u, v 的实部均在区间 $[-1, 0]$ 中, 且和为 -1 , 故不妨设 $u = -a + bi$, 其中 $0 \leq a \leq \frac{1}{2}$, $b \in \mathbb{R}$, 则 $v = -1 + a - bi$. 再由 $|v| \leq 1$ 知

$$b^2 \leq 2a - a^2 \quad (2)$$

由计算易知

$$uv = x + yi,$$

其中 $x = a(1 - a) + b^2$, $y = b(2a - 1)$. 因此

$$\begin{aligned}
& |z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1|^2 + |z_1 z_2 z_3|^2 \\
&= |z_1|^4 \cdot |u + uv + v|^2 + |z_1|^6 \cdot |uv|^2 \\
&< |u + uv + v|^2 + |uv|^2 \\
&= |-1 + x + yi|^2 + |x + yi|^2 = 2(x^2 + y^2 - x) + 1 \\
&= 2((a(1 - a) + b^2)^2 - a(1 - a) - b^2 + b^2(2a^2 - 1)^2) + 1 \\
&= 2((b^2 - a(1 - a))^2 - a(1 - a)) + 1. \tag{3}
\end{aligned}$$

由 (2) 得, $-a \leq b^2 - a(1 - a) \leq a$, 并注意到 $0 \leq a \leq \frac{1}{2}$, 可知

$$(b^2 - a(1 - a))^2 \leq a^2 \leq a(1 - a). \tag{4}$$

结合 (3) 和 (4) 可得

$$|z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1|^2 + |z_1 z_2 z_3|^2 < 1.$$

这表明 λ 的最小值不超过 1.

另一方面, 对任意 $r (0 < r < 1)$, 取 $(z_1, z_2, z_3) = (r, -r, 0)$, 可得 $\lambda > r^2$, 令 $r \rightarrow 1$, 可得 $\lambda \geq 1$.

故所求的最小正实数 λ 为 1. \square

解 2 设 $a = |z_1|^2$, $b = |z_2|^2$, $c = |z_3|^2$, 则

$$\begin{aligned}
& |z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1|^2 + |z_1 z_2 z_3|^2 \\
&= (z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1)(\overline{z_1 z_2} + \overline{z_2 z_3} + \overline{z_3 z_1}) + abc \\
&= ab + bc + ca + \sum |z_i|^2(z_2 \overline{z_3} + z_3 \overline{z_2}) + abc \\
&= ab + bc + ca + \sum |z_i|^2(|z_2|^2 + |z_3|^2 - |z_2|^2 - |z_3|^2) + abc \\
&= ab + bc + ca + \sum a(a - b - c) + abc \\
&= a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac + abc \\
&= (a - 1)(b - 1)(c - 1) + 1 < 1
\end{aligned}$$

由上面不等式的最后一步可看出, 当 a, b, c 中有一个趋于 1 时, 所研究的表达式趋于 1, 这说明常数 1 是最佳的. \square

评注 解 1 的想法是先用最大模思想把三个变元问题转化成两个变元问题, 然后用条件设定好复变元的表达形式, 从而将复变元问题转化成实变元问题进行计算. 解 2 是几位集训队队员的解法, 想法的关键是先研究所有变元

都是实数时, 应怎样来证明结论? 这样就可发现一个实数的恒等式, 复数情况本质上完全一样. 只是过程中要用上复数模的两个常用公式: $|z|^2 = z\bar{z}$ 及 $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + z_1\bar{z}_2 + z_2\bar{z}_1$.

题 7 (Titu Andreescu, Gabriel Dospinescu [1]) 设实数 $x_1, x_2, \dots, x_n \in (0, 1)$. 对 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的任意一个排列 σ , 证明:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{1-x_i} \geq \left(1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{1-x_i x_{\sigma(i)}}\right).$$

分析 注意到右边的第一个和式可写为 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (1+x_i)$, 自然联想到简单的关系式

$$\frac{1}{1-x_i} = (1+x_i) \cdot \frac{1}{1-x_i^2}$$

如果我们观察到 $\{1+x_i\}$ 和 $\{\frac{1}{1-x_i^2}\}$ 是两个同序的实数组, 便自然联想到切比雪夫不等式. 因此如果我们能证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{1-x_i x_{\sigma(i)}} \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{1-x_i^2},$$

便可用切比雪夫不等式直达目标.

解 设 y_1, y_2, \dots, y_n 是 x_1, x_2, \dots, x_n 的一个排列, 则由算术—几何平均值不等式并注意到一个十分常用的不等式 $\frac{1}{x+y} \leq \frac{1}{4x} + \frac{1}{4y}$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1-x_i y_i} &\leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{1-\frac{x_i^2+y_i^2}{2}} \\ &= 2 \sum_{i=1}^n \frac{1}{1-x_i^2+1-y_i^2} \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2(1-x_i^2)} + \frac{1}{2(1-y_i^2)} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{1-x_i^2}. \end{aligned}$$

因此, 要证本题的不等式, 我们仅须证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{1-x_i} \geq \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n (1+x_i) \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{1-x_i^2} \right). \quad (1)$$

(1) 的证明是不难的. 事实上, 不妨设 $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \leq 1$ 则

$$1+x_1 \leq 1+x_2 \leq \dots \leq 1+x_n,$$

且

$$\frac{1}{1-x_1^2} \leq \frac{1}{1-x_2^2} \leq \cdots \leq \frac{1}{1-x_n^2}.$$

这样直接应用切比雪夫不等式便立得 (1). \square

题 8 (M. Kurylo, World Math.) 设 $\{F_n\}$ 是一个 Fibonacci 数列: $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. 证明: 对任意 $x \in \mathbb{R}$, $n \geq 2$ 均有

$$\sum_{k=1}^n F_k |x - k| \geq F_{n+2} + F_n - n - 1.$$

首先, 我们有必要回忆一下分段线性函数 $f(x) = \sum_{i=1}^n k_i |x - a_i|$ 的基本性质, 至少有两个结论是常用的:

1) 设 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$, 函数 $f(x) = \sum_{i=1}^n |x - a_i|$, 则当 $n = 2k + 1$ 时, $f(x)$ 的最小值点为 a_{k+1} , 其最小值为 $\sum_{i=k+2}^n a_i - \sum_{i=1}^k a_i$; 当 $n = 2k$ 时, 区间 $[a_k, a_{k+1}]$ 上的每一个点均为 $f(x)$ 的最小值点, 其最小值为 $\sum_{i=k+1}^n a_i - \sum_{i=1}^k a_i$.

2) 设 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$, 而 k_1, k_2, \dots, k_n 都是正实数, 则函数 $f(x) = \sum_{i=1}^n k_i |x - a_i|$ 的最小值在 $x = a_{i_0+1}$ 取到, 其中的 i_0 是满足

$$k_1 + k_2 + \cdots + k_i \leq k_{i+1} + k_{i+2} + \cdots + k_n$$

的最大正整数 i .

证明 由 Fibonacci 数列 $\{F_n\}$ 的一个著名性质

$$F_1 + F_2 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1$$

可得

$$F_1 + F_2 + \cdots + F_{n-2} - F_{n-1} - F_n = -F_{n-1} - 1 < 0.$$

因此

$$F_1 + F_2 + \cdots + F_{n-2} < F_{n-1} + F_n.$$

但显然

$$F_1 + F_2 + \cdots + F_{n-2} + F_{n-1} > F_n.$$

故函数 $f(x) = \sum_{k=1}^n F_k |x - k|$ 的最小值为

$$f(n-1) = (n-2)F_1 + \cdots + F_{n-2} + F_n.$$

再用数学归纳法易证明

$$(n-2)F_1 + \cdots + F_{n-2} + F_n = F_{n+2} + F_n - n - 1.$$

这样便得到了我们要证的不等式. \square

补注 上例用到了分段线性函数的基本性质 2). 这里再介绍基本性质 1) 的一个应用.

例 设 $a_1, a_2, \dots, a_{2n+1}$ ($n \geq 1$) 是和为 0 的 $2n+1$ 个实数, y 是函数 $f(x) = \sum_{i=1}^{2n+1} |x - a_i|$ 的最小值点. 证明:

$$y \leq \frac{1}{2(n+1)} \sum_{i=1}^{2n+1} |a_i|.$$

证明 不妨设 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_{2n+1}$, 则 $y = a_{n+1}$. 因此, 我们仅须证明

$$a_{n+1} \leq \frac{1}{2(n+1)} \sum_{i=1}^{2n+1} |a_i|. \quad (1)$$

如果 $a_{n+1} \leq 0$, 则 (1) 显然成立. 因此不妨设

$$a_1 \leq \cdots \leq a_k < 0 \leq a_{k+1} \leq \cdots \leq a_{n+1} \leq \cdots \leq a_{2n+1}.$$

这时由条件 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n+1} = 0$ 可得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{2n+1} |a_i| &= -a_1 - \cdots - a_k + a_{k+1} + \cdots + a_{n+1} + \cdots + a_{2n+1} \\ &= 2(a_{k+1} + \cdots + a_{n+1} + \cdots + a_{2n+1}) \\ &\geq 2(a_{n+1} + \cdots + a_{2n+1}) \geq 2(n+1)a_{n+1} \end{aligned}$$

这就是要证的不等式 (1). \square

题 9 (Gabriel Dospinescu [1]) 设 $n \geq 2$ 是整数, 求最大的正实数 m_n 和最小的正实数 M_n 使得对任何正实数 x_1, x_2, \dots, x_n 有

$$m_n \leq \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{x_{i-1} + 2(n-1)x_i + x_{i+1}} \leq M_n.$$

其中 $x_0 = x_n, x_{n+1} = x_1$.

分析 首先猜测 m_n 和 M_n 值及相应的可能极值点. 等变量的情况是优先考虑的: 当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 时, 和式的值等于 $\frac{1}{2}$. 这是可能的最大值还是最小值呢? 再取 $n = 3, x_1 = x_2 = 1, x_3 = 0$. 这时和式的值是 $\frac{2}{5} < \frac{1}{2}$. 这说明等变量处可能取到最大值, 亦即猜测 $M_n = \frac{1}{2}$.

现在可能的最大下界自然应猜测在 $x_1 = 1, x_2 = \varepsilon, \dots, x_n = \varepsilon^{n-1}$ 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时取得, 这是因为 $(1, \varepsilon, \dots, \varepsilon^{n-1}) \rightarrow (1, 0, 0, \dots, 0)$, 而后者是一个特殊的边界点—顶点. 这样 m_n 的值就可能等于 $\frac{1}{2(n-1)}$.

解 记 $S = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{x_{i-1} + 2(n-1)x_i + x_{i+1}}$. 整个解答过程分两部分:

1) 先证明 S 的最优下界是 $\frac{1}{2(n-1)}$.

事实上, 注意到下面显然的不等式

$$x_{i-1} + 2(n-1)x_i + x_{i+1} \leq 2(n-1) \left(\sum_{i=1}^n x_i \right), i = 1, 2, \dots, n.$$

我们有

$$S \geq \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{2(n-1) \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)} = \frac{1}{2(n-1)}.$$

另一方面, 取 $x_1 = 1, x_2 = \varepsilon, \dots, x_n = \varepsilon^{n-1}$, 这时 S 的值等于

$$\frac{1}{\varepsilon^{n-1} + 2(n-1) + \varepsilon} + \frac{(n-2)\varepsilon}{1 + 2(n-1)\varepsilon + \varepsilon^2} + \frac{\varepsilon^{n-1}}{\varepsilon^{n-2} + 2(n-1)\varepsilon^{n-1} + 1}.$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则 $S \rightarrow \frac{1}{2(n-1)}$.

这就说明了 $\frac{1}{2(n-1)}$ 是 S 的最大下界, 即 $m_n = \frac{1}{2(n-1)}$.

2) 再证明 S 的最大值是 $\frac{1}{2}$.

为此需要一个引理:

引理 (罗马尼亚TST, 1999) 设正实数 a_1, a_2, \dots, a_n 满足 $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$, 则

$$\frac{1}{n-1+a_1} + \frac{1}{n-1+a_2} + \cdots + \frac{1}{n-1+a_n} \leq 1.$$

引理证明 记 $r = 1 - \frac{1}{n}$. 由算术—几何平均值不等式和条件可得

$$a_1^r + \cdots + a_{i-1}^r + a_{i+1}^r + \cdots + a_n^r \geq (n-1)a_i^{-\frac{1}{n}}.$$

因此

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{n-1+a_i} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i^r}{(n-1)a_i^{-\frac{1}{n}} + a_i^r} \geq \sum_{i=1}^n \frac{a_i^r}{a_1^r + a_2^r + \cdots + a_n^r} = 1.$$

这等价于引理中要证的不等式.

回到原题. 记 $a_i = \frac{\sqrt{x_{i-1} \cdots x_{i+1}}}{x_i}$, 则 $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$.

这时由引理便得

$$2S \leq \sum_{i=1}^n \frac{2x_i}{2\sqrt{x_{i-1} \cdot x_{i+1}} + 2(n-1)x_i} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n-1+a_i} \leq 1.$$

故 $S \leq \frac{1}{2}$. 又当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时, $S = \frac{1}{2}$. 所以 $M_n = \frac{1}{2}$. \square

题 10 (Kober 不等式) 设 a_1, a_2, \dots, a_n 是正实数, 证明:

$$(n-1) \sum_{i=1}^n a_i^2 + n(a_1 a_2 \cdots a_n)^{\frac{2}{n}} \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2.$$

分析 直觉告诉我们 $(a_1 a_2 \cdots a_n)^{\frac{2}{n}}$ 最不易处理, 于是我们就用齐次性把它“隐”去, 可设 $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$. 再注意到本问题取等号条件并不唯一, 如当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 或其中有一个为 0, 其余 $n-1$ 个均相等时等号成立. 这时宜用调整法. 一种非常合理的调整策略是: 设定最小变元, 把其它元都调为相等. 由于调整过程需要若干步, 因此结合用归纳法可使问题大大简化.

解 1 由齐次性, 不妨设 $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$. 这时要证不等式转化为

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 - (n-1) \sum_{i=1}^n a_i^2 - n \leq 0.$$

现对 n 用归纳法.

当 $n = 1, 2$ 时, 结论显然成立.

假设结论对 $n-1$ 成立, 下证结论对 n 成立.

不妨设 $a_1 = \min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 并记 $G = \sqrt[n-1]{a_2 \cdots a_n}$. 这时要证

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq 0.$$

我们只须证明

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq f(a_1, G, \dots, G), \quad (1)$$

和

$$f(a_1, G, \dots, G) \leq 0. \quad (2)$$

先证 (1): 易知 (1) 可等价写为

$$(n-1) \sum_{i=2}^n a_i^2 - \left(\sum_{i=2}^n a_i \right)^2 \geq 2a_1 \left(\sum_{i=2}^n a_i - (n-1)G \right). \quad (3)$$

注意到

$$a_1 \leq G, \quad \sum_{i=2}^n a_i \geq (n-1)G,$$

要证 (3), 我们仅须证明

$$(n-1) \sum_{i=2}^n a_i^2 - \left(\sum_{i=2}^n a_i \right)^2 \geq 2G \left(\sum_{i=2}^n a_i - (n-1)G \right). \quad (4)$$

由于 (4) 关于 a_2, \dots, a_n 是齐次的, 因此不妨设 $G = 1$.

这时要证不等式 (4) 就等价于

$$(n-2) \sum_{i=2}^n a_i^2 - \left(\sum_{i=2}^n a_i \right)^2 + (n-1) \geq 2 \sum_{i=2}^n a_i - \sum_{i=2}^n a_i^2 - (n-1). \quad (5)$$

现对 a_2, \dots, a_n 用归纳假设知 (5) 的左边大于等于 0, 故要证 (5), 我们只须证明

$$2 \sum_{i=2}^n a_i - \sum_{i=2}^n a_i^2 - (n-1) \leq 0.$$

这等价于

$$\sum_{i=2}^n (a_i - 1)^2 \geq 0.$$

它是显然成立的, 故 (1) 得证.

再证 (2):

因为 $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$, 所以 $a_1 = \frac{1}{G^{n-1}}$. 这时易知 (2) 等价于

$$\frac{n-2}{G^{2n-2}} + n \geq \frac{2n-2}{G^{n-2}}. \quad (6)$$

事实上, 由算术-几何平均值不等式, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{n-2}{G^{2n-2}} + n &= \underbrace{\frac{1}{G^{2n-2}} + \cdots + \frac{1}{G^{2n-2}}}_{n-2} + \underbrace{1 + \cdots + 1}_n \\ &\geq (2n-2) \sqrt[2n-2]{\left(\frac{1}{G^{2n-2}}\right)^{n-2} \cdot 1^n} = \frac{2n-2}{G^{n-2}} \end{aligned}$$

(6) 得证, 从而 (2) 得证. \square

解 2 (饶家鼎) 由齐次性, 不妨设 $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$. 这时要证不等式转化为

$$g(a_1, a_2, \dots, a_n) = (n-1) \sum_{i=1}^n a_i^2 + n - \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 \geq 0.$$

现对 n 用归纳法.

当 $n = 1, 2$ 时, 结论显然成立.

假设结论对 $n-1$ 成立, 下证结论对 n 成立. 不妨设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n$.

若 $a_n \geq 1$, 则必有 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 1$. 此时结论显然成立. 下面只须考虑 $a_n < 1$ 的情况.

a) 若 $a_{n-1} \geq 1$, 则 $a_i \geq 1$, $i = 1, 2, \dots, n-1$.

由 Cauchy 不等式可得

$$(n-1)(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2) \geq (a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1})^2.$$

这时要证结论对 n 成立, 只须证明:

$$\frac{n-2}{2}a_n^2 + \frac{n}{2} \geq a_n(a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}). \quad (6)$$

事实上, 由广义贝努里不等式有

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} \leq a_1 a_2 \cdots a_{n-1} + n - 2 = \frac{1}{a_n} + n - 2.$$

故

$$\begin{aligned} a_n(a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}) &\leq 1 + (n-2)a_n \\ &\leq 1 + \frac{n-2}{2}(a_n^2 + 1) \\ &= \frac{n-2}{2}a_n^2 + \frac{n}{2}, \end{aligned}$$

(6) 得证.

b) 若 $a_{n-1} < 1$, 我们断言下面两个不等式 (7) 和 (8) 至少有一个成立.

$$g(a_1, a_2, \dots, a_n) \geq g(a_1 a_n, a_2, \dots, a_{n-1}, 1); \quad (7)$$

$$g(a_1, a_2, \dots, a_n) \geq g(a_1, a_2, \dots, a_{n-1} a_n, 1). \quad (8)$$

事实上, (7) 等价于

$$(n-1)(1-a_1^2)(1-a_n^2) \leq (1-a_1)(1-a_n)\{(1+a_1)(1+a_n) + 2(S-a_1-a_n)\}, \quad (9)$$

其中 $S = \sum_{i=1}^n a_i$.

注意到 $a_1 \geq 1 \geq a_n$, 化简 (9) 知 (7) 等价于

$$\frac{n-2}{2}(1+a_1)(1+a_n) + a_1 + a_n \geq S. \quad (10)$$

同理 (8) 等价于

$$\frac{n-2}{2}(1+a_{n-1})(1+a_n) + a_{n-1} + a_n \leq S. \quad (11)$$

因 (10) 式左边显然不小于 (11) 式左边, 故 (10) 和 (11) 中至少有一个成立, 这也证明了 (7) 和 (8) 中至少有一个成立.

由 (7) 和 (8) 中至少有一个成立, 说明存在乘积为 1 的 $n-1$ 个正实数 b_1, b_2, \dots, b_{n-1} 使得

$$g(a_1, a_2, \dots, a_n) \geq g(b_1, b_2, \dots, b_{n-1}, 1).$$

现在我们只须证明 $g(b_1, b_2, \dots, b_{n-1}, 1) \geq 0$, 亦即

$$(n-1) \sum_{i=1}^{n-1} b_i^2 + 2n - 1 \geq \left(\sum_{i=1}^{n-1} b_i + 1 \right)^2. \quad (12)$$

而由归纳假设, 我们有

$$(n-2) \sum_{i=1}^{n-1} b_i^2 + n - 1 \geq \left(\sum_{i=1}^{n-1} b_i \right)^2. \quad (13)$$

这样要证 (12), 只须证明

$$\sum_{i=1}^{n-1} b_i^2 + n - 1 \geq 2 \sum_{i=1}^{n-1} b_i,$$

这等价于 $\sum_{i=1}^{n-1} (b_i - 1)^2 \geq 0$, 显然成立. 故 (12) 成立.

综上, 说明结论对 n 成立. \square

补注 本题中的不等式有些文献上又叫 Turkevici 不等式. 我们这里之所以叫它 Kober 不等式, 一方面是沿用《解析不等式》(D.S. 密特利诺维奇著, 中译本, 科学出版社, 1987) 一书的叫法, 另一方面是注意到 Kober 在他的那篇文章 (刊于 Proc. Amer. Math. Soc. 9, 1958) 中提出了算术—几何平均值不等式的一个加强形式 (本题的等价形式), 近期被应用到高维几何不等式的稳定性研究中.

Kober 不等式的一个推广是下面的 Surányi 不等式:

设 a_1, a_2, \dots, a_n 是正实数, 则

$$(n-1) \sum_{i=1}^n a_i^n + n \prod_{i=1}^n a_i \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{i=1}^n a_i^{n-1} \right).$$

最近, M.Bencze 进一步把 Surányi 不等式不等式推广到了凸函数, 他的结果可表述为:

设 a_1, a_2, \dots, a_n 是区间 I 上的正实数, f 和 f' 都是 I 上的凸函数, 则

$$(n-1) \sum_{i=1}^n f(a_i) + n f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i\right) \geq \sum_{1 \leq i, j \leq n} f\left(\frac{(n-1)a_i + a_j}{n}\right).$$

下面来看一些组合问题.

题 11 (环球城市联赛, 2015) 现有 15 个和为 0 的整数, 其中至多有一个为 0. 现在一张纸上写出这些数的所有 7 元子集的元素和, 另一张纸上写出所有 8 元子集的元素之和. 问两张纸上写出的和数整体是否可能完全相同, 包括各数的出现次数?

分析和解 考虑一般的元素之和为 0 的 $2n+1$ 元集合 X , 它的所有 n 元子集构成的集族记为 F_1 , 它的所有 $n+1$ 元子集构成的集族记为 F_2 . 对任意一

个 n 元子集 $A \in F_1$, A 的补集 $X \setminus A \in F_2$, A 的所有元素之和与补集 $X \setminus A$ 的元素之和为 0.

因此我们取 X 是关于原点对称的集合 (即 $X = -X$), 则 $-(X \setminus A)$ 仍然属于 F_2 , 且 A 和 $-(X \setminus A)$ 的元素之和相等. 这样映射 $A \rightarrow -(X \setminus A)$ 是 F_1 和 F_2 上的一个一一映射, 从而两组和数完全相同. \square

题 12 (匈牙利, 2011) 凸 2011 边形满足任意四点不共圆, 过每三个顶点作一个圆. 若多边形有在圆外的顶点, 则称此圆为“瘦的”, 反之, 则称为“胖的”. 问胖圆和瘦圆哪个多?

分析和解 对这 2011 个顶点中的任意四点 A, B, C, D . 不妨设

$$\angle A + \angle C < 180^\circ.$$

这时, 点 C 在 $\triangle ABD$ 的外接圆外, 而点 A 在 $\triangle BCD$ 的外接圆外. 这说明由 A, B, C, D 确定的 4 个圆中至少有 2 个瘦圆. 故瘦圆个数不小于胖圆个数.

下面进一步证明瘦圆个数不等于胖圆个数.

若瘦圆个数等于胖圆个数, 记为 a . 由于这 2011 个顶点可确定 C_{2011}^4 个四点组, 从而可确定 $4C_{2011}^4$ 个圆, 而任何一个三点组确定的圆出现在 $2011 - 3 = 2008$ 个四点组中, 故

$$a = \frac{1}{2} \cdot \frac{4C_{2011}^4}{2008}.$$

但这不是整数, 矛盾!

综上便知瘦圆数大于胖圆数. \square

题 13 设整数 $n \geq 2$, $X = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 其中 a_i 是正整数, 且 $a_i \geq n, i = 1, 2, \dots, n+1$. 证明: 存在 $1 \leq i \neq j \leq n+1$ 使得 $[a_i, a_j] > n^2$.

分析 要证一个存在性的不等式, 想到用抽屉原理. 但 a_i 是无界的, 因此取倒数, 这时 $\frac{1}{a_i}$ 变成有界量了, 从而方便构造抽屉.

证明 不妨设 $a_1 > a_2 > \dots > a_{n+1} \geq n$, 则

$$0 < \frac{1}{a_1} \leq \frac{1}{a_i} \leq \frac{1}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n+1.$$

现将区间 $[\frac{1}{a_1}, \frac{1}{n}]$ 等分成 n 个小区间, 则每个小区间的长度小于 $\frac{1}{n^2}$.

如果存在 a_i ($2 \leq i \leq n+1$) 使得 $\frac{1}{a_i}$ 落在第一个小区间内, 则有

$$0 < \frac{1}{a_i} - \frac{1}{a_1} < \frac{1}{n^2}.$$

如果所有 a_i ($2 \leq i \leq n+1$) 使得 $\frac{1}{a_i}$ 均不落在第一个小区间内, 则由抽屉原理知存在 $2 \leq i < j \leq n+1$, 使得

$$0 < \frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_i} < \frac{1}{n^2}.$$

这样, 不管是哪种情况, 总存在 $1 \leq i < j \leq n+1$, 使得

$$0 < \frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_i} < \frac{1}{n^2}. \quad (1)$$

因为对任意正整数 a, b 有 $ab = (a, b)[a, b]$, 故由 (1) 可得

$$0 < \frac{\frac{a_i-a_j}{(a_i, a_j)}}{[a_i, a_j]} < \frac{1}{n^2}. \quad (2)$$

又注意到 $\frac{a_i-a_j}{(a_i, a_j)}$ 是正整数, 故由 (2) 立得 $[a_i, a_j] > n^2$. \square

题 14 (全苏联冬令营, 1987) 设 $\{a_n\}$ 是递增的正整数序列, $a_1 = 1$, 且对任意正整数 n 有 $a_{n+1} \leq 2n$. 证明: 任何不小于 2 的整数都可表示为 $a_i + a_j$ 的形式, 其中 i 可以等于 j .

分析 注意对递增 (这里均指严格递增) 的正整数序列 $\{a_n\}$, 若该序列中小于 k 的项数至多为 m 项, 则 $a_{m+1} \geq k$. 这是整数离散性的一种表现.

证明 用反证法. 假设结论不成立, 则存在 $k > 2$ 无法表为 $a_i + a_j$ 的形式.

1) 当 k 为奇数时, 数对 $(1, k-1), (2, k-2), \dots, (\frac{k-1}{2}, \frac{k+1}{2})$ 的每一组数中, 都至多有一个在序列 $\{a_n\}$ 中, 故序列 $\{a_n\}$ 中小于 k 的至多有 $\frac{k-1}{2}$ 项.

2) 当 k 为偶数时, 数对 $(1, k-1), (2, k-2), \dots, (\frac{k}{2}-1, \frac{k}{2}+1)$ 的每一组数中, 都至多有一个在序列 $\{a_n\}$ 中, 而 $\frac{k}{2}$ 也不能属于 $\{a_n\}$ 中. 故序列 $\{a_n\}$ 中小于 k 的至多有 $\frac{k}{2}-1$ 项.

综上, 序列 $\{a_n\}$ 中小于 k 的至多有 $\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor$ 项. 故

$$a_{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor + 1} \geq k.$$

但

$$a_{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor + 1} \leq 2 \left\lfloor \frac{k-1}{2} \right\rfloor \leq k-1,$$

矛盾! 这说明对任何大于 2 的整数可表为 $a_i + a_j$ 的形式, 又 $2 = a_1 + a_1$, 故对一切 $k \geq 2$ 的整数结论成立. \square

题 15 (伊朗, 2012) 求所有正整数序列 $\{a_n\}$, 使得对任意 $i \leq j$ 均有 $a_i \leq a_j$ 且对任意的正整数 i, j , $i+j$ 的正因数个数与 $a_i + a_j$ 的正因数的个数相等.

分析 很自然猜测自然数序列 n 是满足条件的唯一的序列. 注意到 $a_1 = 1$, 如果我们能证明 $\{a_n\}$ 严格递增且在一个无穷子序列上的每一个值等于下标的标号数, 则我们就证明了 $a_n = n$.

解 首先证明 $\{a_n\}$ 严格递增.

若不然, 假设存在正整数 i 使得 $a_i = a_{i+1}$. 取 $j = p - i$, 其中 p 是一个大于 $i + 1$ 的素数. 这时由 $i + j$ 是素数知 $a_i + a_j$ 也是素数. 因为 $a_i = a_{i+1}$, 所以 $a_{i+1} + a_j$ 也是素数, 从而 $i + 1 + j$ 也是素数. 这样我们找到了相邻两整数 $i + j$ 和 $i + 1 + j$ 均是素数, 矛盾!

再证 $a_n = n$.

显然 $a_1 = 1$. 取 $i = j = 2^{p-2}$, 其中 p 是不小于 3 的素数, 则 $i + j = 2i = 2^{p-1}$ 的正因数的个数为 p . 故 $a_i + a_j = 2a_i$ 的正因数的个数也为 p . 这样, $2a_i$ 必须等于 2^{p-1} . 故 $a_{2^{p-2}} = 2^{p-2}$. 这说明两个严格递增的正整数序列 a_n 和 $\{n\}$ 的首项相等, 且在一个无穷子序列 $\{2^{p-2}\}$ 上的值对应相等. 故对所有正整数 n 均有 $a_n = n$. \square

题 16 (全苏联国家队夏令营, 1985) 在无穷大方格纸上标出了 n 个方格, 称两个方格为“相邻的”, 如果它们具有公共边或公共顶点. 证明: 可以从所标出的方格中挑选出 $k \geq \frac{n}{4}$ 个方格, 使得它们之中任何两个都不相邻.

证明 平面上的每个方格用整点 $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ 表示. 将平面上的整点分划成如下的四个集合:

$$\begin{aligned} A_{00} &= \{(x, y) \mid x, y \equiv 0, \pmod{2}\} \\ A_{10} &= \{(x, y) \mid x \equiv 1, y \equiv 0, \pmod{2}\} \\ A_{01} &= \{(x, y) \mid x \equiv 0, y \equiv 1, \pmod{2}\} \\ A_{11} &= \{(x, y) \mid x, y \equiv 1, \pmod{2}\}, \end{aligned}$$

则这四个集合中的每个集合中整点对应的方格两两不相邻.

设标出的方格集为 S , 则

$$\bigcup_{0 \leq i, j \leq 1} (A_{ij} \cap S) = S.$$

故必有一个 A_{ij} ($i, j \in \{0, 1\}$) 使得

$$|A_{ij} \cap S| \geq \frac{|S|}{4} = \frac{n}{4}.$$

因此取 $A_{ij} \cap S$ 中的方格满足要求. \square

题 17 (塞尔维亚, 2012) 设 K 是平面直角坐标系上的整点集. 问: 是否存在双射 $f: \mathbb{N}^* \rightarrow K$, 使得对任意的 $a, b, c \in \mathbb{N}^*$, 若 $(a, b, c) > 1$, 则 $f(a), f(b), f(c)$ 不共线?

本题要用整点集是一个可列集(通俗地说, 即可以用自然数来编号)这一结论. 尽管它直观上是好理解的, 似乎还是有点超越中学生的知识范围. 幸好参加新星五一班的不少同学熟悉这个结论. 在这一结论的基础上, 我们通过归纳构造证明存在满足要求的双射.

分析和解 首先将平面上的整点编号, 记为 $K = \{A_1, A_2, \dots\}$. 现要给出 \mathbb{N}^* 到 K 的一个满足要求的一一映射, 本质上是要我们重新给出 K 的一个编号. 先摸索着前进. 当然取 $f(1) = A_1, f(2) = A_2, f(3) = A_3, f(4) = A_4, f(5) = A_5$.

但 $f(6)$ 呢? 因为 $(2, 4, 6) = 2$, 因此 $f(6)$ 不能在直线 A_2A_4 上, 这时我们取 $f(6)$ 为 K 中除去 $A_1 \sim A_5$ 且不在直线 A_2A_4 上的下标最小的 A_j (事实上, 如果点 A_6 在直线 A_2A_4 上, 取 $f(6) = A_7$; 如果点 A_6 不在直线 A_2A_4 上, 仍取 $f(6) = A_6$).

再考虑 $f(7)$ 的值. 因 7 是素数, 这样我们取 $f(7)$ 为 K 中除去 $f(1) \sim f(6)$ 对应点的具有最小下标 j 的点 A_j .

现在一般的 $f(n)$ 的构造就不难了. 事实上, 假设 $f(1), f(2), \dots, f(n-1)$ 已被选定对应点, 则取 $f(n) = A_m$, 其中下标 m 为满足对任意 $i, j \leq n$ 有 $(i, j, n) > 1$, 点 A_m 不在直线 $f(i)f(j)$ 上 (因这样的直线的条数有限, A_m 一定存在) 的所有下标中的最小者. 特别地, 对素数 p , $f(p)$ 对应着 K 中没有被选取的具有最小下标的整点.

显然, 这样构造的 f 确是 \mathbb{N}^* 到 K 的一个满足条件的一一映射. \square

参考文献

- [1] T. Andreescu, V. Cirtoaje, G. Dospinescu and M. Lascu, Old and New inequalities, GIL Publishing House, 2004.